2016

MATHEMATICS

(General)

Paper : 5.2

(Numerical Methods and Spherical Astronomy)

Full Marks: 80

Time: 3 hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions

Answer either in English or in Assamese

GROUP-A

(Numerical Methods)

1. Answer the following questions:

 $1 \times 4 = 4$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) Establish the relation $E = 1 + \Delta$. $E = 1 + \Delta$ সম্বন্ধটো স্থাপন কৰা।
- (b) What is meant by interpolation?
 অন্তর্বেশন বুলিলে কি বুজা?

(d) State Newton's backward interpolation formula.

নিউটনৰ পশ্চদিশিক (backward) অন্তৰ্বেশন সূত্ৰটো লিখা।

- 2. Answer the following questions : 2×3=6
 তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :
 - (a) Evaluate : মান নিৰ্ণয় কৰা :

$$\Delta^2 e^{ax+b}$$

(b) Prove that প্ৰমাণ কৰা যে

$$(1+\Delta)(1-\Delta)=1$$

(c) Construct a divided difference table from the following data :
তলত দিয়া তালিকাৰ পৰা এখন বিভাঞ্জিত অন্তৰৰ টেবুল গঠন কৰা :

$$x : -1 \quad 1 \quad 2 \quad 3$$

 $y : -21 \quad 15 \quad 12 \quad 3$

3. (a) Evaluate:

মান নিৰ্ণয় কৰা:

$$\frac{\Delta^2}{E}\sin(x+h) + \frac{\Delta^2\sin(x+h)}{E\sin(x+h)}$$

Or /অথবা

Determine the function whose first difference is $9x^2 + 11x + 5$.

তनত निया প্रथम अस्तर भवा ফলনটো निर्नय कवा :

$$9x^2 + 11x + 5$$

(b) State and prove Newton's formula for forward interpolation.

নিউটনৰ অগ্ৰগামী অন্তৰ্বেশন সূত্ৰ লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা।

Or /অথবা

Applying Lagrange's formula, obtain the value of f(9) using the following table:

তলত দিয়া তালিকাখন ব্যৱহাব কৰি লাগ্ৰাঞ্জৰ সূত্ৰৰ সহায়ত f(9)ৰ মান উলিওৱা :

 \dot{x} : 5 7 11 13 17 f(x): 150 392 1452 2366 5202

A7/70

(Continued

(Turn Over

5

5

- 4. Answer either (a) or (b) of the following : তলৰ (a) অথবা (b) অংশৰ উত্তৰ কৰা :
 - (a) (i) Obtain cube root of 10 to 4 decimal places using Newton-Raphson method.
 নিউটন-ৰাফ্ছন্ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কবি 4 দশমিক স্থানলৈ 10 ব ঘনমূল উলিওৱা।
 - (ii) Find a real root of the equation $x^3 2x 5 = 0$ correct to 3 decimal places using bisection method.

 দ্বিভাজন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি $x^3 2x 5 = 0$ সমীকৰণৰ এটা বাস্তৱ মূল 3 দশমিক স্থানলৈ উলিওৱা।
 - (b) (i) Starting with x = 0.21, solve $x = 0.21 \sin(0.5 + x)$ using iteration method. পুনৰাবৃত্তি পদ্ধতিৰে x = 0.21ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাধান কৰা $x = 0.21 \sin(0.5 + x)$.
 - (ii) Find the root of the equation $x^4 x 10 = 0$ which is nearer to x = 2 to 3 places of decimal. $x^4 x 10 = 0$ সমীকবণৰ x = 2ৰ নিকটবৰ্তী মুলটো 3 দশমিক স্থানলৈ উলিওৱা।

GROUP-B

(Spherical Astronomy)

- 5. Answer the following questions as directed :
 1×6=6
 নিৰ্দেশানুযায়ী তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :
 - (a) Define secondary circle of a great circle.
 এটা গুৰুবৃত্তৰ গৌণবৃত্তৰ সংজ্ঞা দিয়া।
 - (b) Write one property of pole of a great circle.

 এটা গুৰুবৃত্তৰ মেকৰ এটা ধৰ্ম লিখা।
 - (c) State the cosine formula related to a spherical triangle.

 এটা গোলক ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত ক'চাইন (cosine)ৰ সূত্ৰটো লিখা।
 - (d) The motion of the sun takes place along a great circle called the _____.(Fill in the blank)

সৃर्यंदे গতি कबा श्वरूनुखरोगित नाम रु'न _____।

(খালী ঠাই পূৰণ কৰা)

A7/70

(Turn Over)

5

5

5

- (e) What are the right ascension and declination of a star situated at the first point of aries?

 মেষৰ প্ৰথম বিন্দৃত (first point of aries) অৱস্থান কৰা তৰা এটাৰ বিষুৱাংশ আৰু বিষুৱ লম্ব কিমান ?
- f) What is the latitude of the sun? সূৰ্যৰ অক্ষাংশ কিমান?
- **6.** (a) In an equilateral spherical triangle ABC, prove that

$$\cos A = \frac{\cos a}{1 + \cos a}$$

এটা সমবাহু গোলক ত্ৰিভূচ্চ ABCৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ কৰা যে

$$\cos A = \frac{\cos a}{1 + \cos a}$$

- (b) In a neat diagram, show the longitude and latitude of a star.
 এটা পৰিস্কাৰ চিত্ৰ আঁকি নক্ষত্ৰ এটাৰ দ্ৰাঘিমাংশ আৰু অক্ষাংশ দেশুওৱা।
- 7. (a) In a spherical triangle ABC, if $b+c=\pi$, then show that $\sin 2B + \sin 2C = 0$.

 এটা গোলক ত্রিভুজ ABCৰ ক্ষেত্রত যদি $b+c=\pi$ হয়, তেন্তে দেবুওরা যে, $\sin 2B + \sin 2C = 0$.

Or / অথবা

In a spherical triangle ABC, prove that $\cos a \cos c = \sin a \cot b - \sin c \cot B$. ABC গোলক ত্রিভূজন ক্ষেত্রত প্রমাণ কৰা যে $\cos a \cos c = \sin a \cot b - \sin c \cot B$.

- (b) If the right ascension of a star is equal to latitude, show that longitude is equal to declination.

 এটা জ্যোভিছৰ বিষুৱাংশ তাৰ অক্ষাংশৰ সমান হ'লে দেশ্বওৱা যে তাৰ দ্ৰাঘিমাংশ বিষুৱ লম্বৰ সমান হয়।
- 8. Answer either (a) and (b) or (c) and (d) :
 (a) আৰু (b) অথবা (c) আৰু (d) ৰ উত্তৰ কৰা :
 - (a) If ψ is the angle which a star makes at rising with the horizon, prove that cos ψ = sin φ sec δ, where φ being observer's latitude and δ being declination of the star.
 এটা তৰাই উদয়ত আনুভূমিকৰ লগত ψ কোণ কৰিলে প্ৰমাণ কৰা যে, cos ψ = sin φ sec δ ব'ত φ হ'ল প্যবৈক্ষকৰ অক্ষাংশ আৰু δ হ'ল তৰাৰ বিষুৱ লয়।
 - (b) Write short notes on : চমু টোকা লিখা :
 - (i) Rising and setting of stars জ্যোতিশ্বৰ উদয়ান্ত
 - (ii) Circumpolar star পৰিশ্ৰুৱী তৰা

(Turn Over)

3+3=6

(Continued)

A7/70

A7/70

(c) If z_1 and z_2 are the zenith distances of a circumpolar star at the upper and lower transits which are on the same side of the zenith, find the latitude of the observer.

মাধ্যাহ্নিক বেখাৰ ওপৰত উৰ্চ্চ আৰু নিম্ন অৱস্থানত মেৰুপ্ৰদেশ ঘেৰি অৱস্থিত নক্ষত্ৰ এটাৰ শীৰ্ষবিন্দুৰ পৰা দূৰত্ব ক্ৰমে z_1 আৰু z_2 হ'লে আৰু দূয়োটা অৱস্থান শীৰ্ষবিন্দুৰ একেফালে অৱস্থিত হ'লে, পৰ্যবেক্ষকৰ অক্ষাংশ উলিওৱা।

(d) If H and A be the hour angle and azimuth of a star at setting, then prove that

 $\cos H = -\tan \phi \tan \delta$ $\cos A = \sec \phi \sin \delta$

where ϕ being latitude of the place and δ being declination of the star.

নক্ষত্ৰ এটাৰ অন্তগমনত হোৱা কোণ H আৰু দিগন্তাংশ A হ'লে, প্ৰমাণ কৰা যে

 $\cos H = -\tan \phi \tan \delta$ $\cos A = \sec \phi \sin \delta$

য'ত φ ঠাইৰ অক্ষাংশ আৰু δ তৰাটোৰ বিষুব লম্ব হয়।

9. (a) Define the following terms:

উলিওবা।

তলত দিয়াবোৰৰ সংজ্ঞা দিয়া:

- (i) Superior planet and inferior planet বহিঃগ্ৰহ আৰু অন্তঃগ্ৰহ
- (ii) Perihelion and aphelion অনুসূৰ আৰু অপসূৰ
- (b) State Kepler's laws of planetary motion.

 Deduce Kepler's second law from
 Newton's law of gravitation. 3+3=6

 গ্ৰহৰ গতি-সম্বন্ধীয় কেপ্লাবৰ সূত্ৰসমূহ লিখা। নিউটনৰ
 মাধ্যাকৰ্ষণ সূত্ৰৰ পৰা কেপ্লাবৰ দ্বিতীয় সূত্ৰটো

Or /অথবা

If V_1 and V_2 be the velocities of two planets in their orbits and r_1 , r_2 be the respective distances from the sun, prove that $V_2: V_1 = \sqrt{r_1}: \sqrt{r_2}$.

নিজ কক্ষপথত দুটা গ্ৰহৰ বেগ V_1 আৰু V_2 , আৰু সূৰ্যৰ পৰা দূৰত্ব ক্ৰমে r_1 , r_2 হ'লে, প্ৰমাণ কৰা যে $V_2:V_1=\sqrt{r_1}:\sqrt{r_2}$.

10. Answer either (a) or (b) :
(a) অথবা (b) ৰ উত্তৰ কৰা :

(a) (i) Define parallax. What is horizontal parallax? 2+2=4 লম্বনৰ সংজ্ঞা লিখা। আনুভূমিক লম্বন কি?

(ii) If S be the semi-vertical angle of the tangent cone to the moon from the earth's centre when the moon's horizontal parallax is P and if S', P' be another similar part, prove that the earth being supposed spherical sin S: sin S' = sin P: sin P'.

পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰবিশ্ব পৰা চন্দ্ৰলৈ টনা স্পৰ্শ শংকুৰ অৰ্থউলয় কোণ S আৰু চন্দ্ৰৰ আনুভূমিক লম্বন P হ'লে আৰু S', P' সদৃশ অন্য এটা অংশ হ'লে, পৃথিৱীক গোলাকাৰ হিচাপে লৈ প্ৰমাণ কৰা যে sin S: sin S' = sin P: sin P'.

6

(Continued)

(b) (i) What is meant by annual parallax of a star? Show that due to annual parallax a star is displaced towards the sun.

2+4=6

নক্ষত্ৰ এটাৰ বাৰ্ষিক লম্বন বুলিলে কি বুজা?

দেখুওৱা যে বাৰ্ষিক লম্বনৰ ফলত নক্ষত্ৰ এটা সূৰ্যৰ দিশত বিষ্ণাপিত হয়।

(ii) Where must a star be situated so that effect of annual parallax is greatest?
ক'ত থাকিলে এটা তৰাৰ বাৰ্ষিক লম্বনৰ ফলত বিহাপন সৰ্বোচ্চ হ'ব ?

(iii) The parallax of a star is 0.023".

Find its distance (1) in persecs and (2) in light years.

এটা তবাৰ লম্বন 0·023". তৰাটোৰ দূৰত্ব উলিওৱা (1) পাৰচেক্ (persecs)ত আৰু (2) আলোকবৰ্ষ (light year)ত।

A7-6000/70

2